

 **BASF**

We create chemistry

Cámbiate a Selontra®

La tecnología de cebo rápido



Consigue tu certificación gratuita de uso de Selontra® para el control de roedores en www.training.selontra.com

CONTROL DE LA INFESTACIÓN

3x más rápido en el control de roedores que los anticoagulantes

100% Controla hasta el 100% de los roedores objetivo, incluso ratas y ratones altamente resistentes

30% Gracias al efecto de interrupción de la alimentación se controla a los roedores con 30% menos de cebo

4x Selontra® es 4 veces más apetecible que la mayoría de los rodenticidas

AVES 50
VECES MENOS
SENSIBLES

El ingrediente activo de Selontra®, colecalciferol, no tiene efectos persistentes en el medio ambiente ni es bioacumulativo, dado que los roedores lo metabolizan fácilmente. Los estudios en aves (codornices y ánades reales) han demostrado que, en comparación con las ratas y ratones, las aves son aproximadamente 50 veces menos sensibles al colecalciferol

-18°C Estable y eficaz en climas fríos de hasta -18°

77°C En climas extremadamente cálidos y húmedos, Selontra® ha demostrado estabilidad y eficacia garantizando excelentes resultados

SELONTRA®


- Rodenticida innovador de alto rendimiento
- Bloque asegurable y listo para usar
- Bloque blando de 20 g (de color verde)
- Altamente apetecible
- Atractivo para ratas y ratones



Selontra® está autorizado para su uso por personal profesional especializado y personal profesional que desempeña su actividad en el entorno de los animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación.

CEBO ALTAMENTE APETECIBLE

En ensayos, Selontra® fue 13,2 veces más apetecible que silo de maíz; 4,3 veces más apetecible que alimento para animales y 4 veces más apetecible que rodenticidas anticoagulantes*.



*Datos de BASF

Modo de acción

Selontra® contiene 0,075% (750 partes por millón) de la sustancia activa **colecalfiferol**, un innovador cebo de formulación maestra.


MODO DE ACCIÓN
EXCLUSIVO DE
COLECALCIFEROL




ALTA
APETENCIA

EL CONTROL TOTAL ES POSIBLE
EN TAN SOLO 7 DÍAS

Impacto en roedores objetivo



Aumenta el nivel de
calcio en la sangre



Pérdida completa de
apetito en 24 horas





Muerte por
hipercalcemia



ESTABILIDAD A TEMPERATURAS EXTREMAS

La formulación de Selontra® ha demostrado **estabilidad y eficacia** tanto en entornos secos como húmedos incluso a **temperaturas extremas** (bajas o altas) garantizando excelentes resultados.



SIN EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE APETENCIA Y EFICACIA

INSTRUCCIONES DE USO

ESPECIES	SITUACIÓN	ÍNDICE DE DOSIS POR PUNTO DE CEBADO*
Ratón doméstico	Interior y exterior alrededor de edificios	20 g a 40 g (1 ó 2 bloques) cada 1 - 2 metros
Rata parda y rata negra	Interior y exterior alrededor de edificios	100 g a 140 g (5 a 7 bloques) cada 5 - 10 metros

Incluidas las cepas resistentes a rodenticidas anticoagulantes y también los roedores neofóbicos.

*En caso de alta infestación use la dosis máxima de cebo con la máxima densidad de colocación del portacebo.

APLICACIÓN TÉCNICA

Para un control rápido, es vital colocar una cantidad suficiente de cebo adecuada al tamaño de la plaga. Si no queda suficiente cebo para los roedores, algunos dejarán de alimentarse antes de ingerir la dosis letal de Selontra® y, por lo tanto, no se podrán controlar y hasta podrían desarrollar cierta aversión al cebo.

NUEVA TECNOLOGÍA DE CEBO RÁPIDO (EN INGLÉS «SPEED BAITING»):

Solo Selontra® permite un sistema de cebado altamente eficaz (en inglés, «speed baiting») para controlar incluso grandes plagas de roedores en tan solo 7 días. Su combinación exclusiva con efecto «**interrupción de la alimentación**» (24 horas después de consumir la dosis letal) y **su alta apetencia** reducen el tiempo que cada nivel jerárquico de la plaga invierte en alimentarse de Selontra®, garantizando que en el mismo tiempo cada roedor consume la dosis letal.

EL PROCEDIMIENTO DE CEBO RÁPIDO ES EL SIGUIENTE:

1. Inspección minuciosa de la zona.
2. Uso de suficientes puntos de cebo acordes con la magnitud de la plaga.
3. Uso de la dosis máxima de la etiqueta en cada punto de cebo.
4. Cuando se empiece a detectar consumo, inspección de cada punto de cebo tras 1-2 días y rellenarlos de nuevo hasta la dosis máxima que indica la etiqueta.
5. ¡El control total de la plaga es posible en tan solo 7 días!

En caso contrario, rellenar con Selontra® los portacebos cada 7 días hasta que se detenga su consumo.

- Selontra® debe asegurarse en un **portacebo** que no pueda ser manipulado en determinados puntos de cebo cubiertos y protegidos.
- Coloque los portacebos **dentro y alrededor de los edificios** haciendo énfasis en áreas donde la actividad sea evidente. También se recomienda colocar portacebos a **cada lado de las entradas** de roedores.
- **Si la ingesta de cebo se prolonga más de una semana**, siga reabastecer hasta que su consumo se detenga.
- Coloque Selontra® **alejado de cualquier fuente de comida y bebida**, así como también de herramientas o superficies con las que estén en contacto.
- **Eliminar cadáveres** mínimo dos veces por semana.



BASF
We create chemistry

BASF Española S.L.
Control profesional de plagas
C/Can Ràbia 3-5.
08017. Barcelona. España
pestinfo@basf.com

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.
Uso seguro de biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo. Selontra® contiene colecalciferol.

Selontra® es una marca registrada de BASF.
© 2017 Copyright BASF.
Todos los derechos reservados.