



DOBOL 2 MG

**INSETICIDA PARA CONTROLO
DE VARIAS ESPECIES DE FORMIGAS**

**Microgranulado (MG) com 0,2 % (p/p) de
Acetamiprida**

Composição: Acetamipride (CAS 135410-20-7) 0,2 %p/p
Outros componentes 99,8 %p/p

Data de fabrico:
N.º lote: (ver embalagem)

Autorização de venda n.º 18845 concedida pela Direção-Geral da Saúde

USO PROFISSIONAL

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO**



Fabricantes:
Kwida France S.A.S.
30, Avenue de l'Amiral Lemonnier
78160 - Marly-le-Roi, França
Telef.: +33 1 39 16 09 69. Fax: +33 1 39 16 47 07

Distribuidor por:
Killgerm, S.A.
C/ de la Imaginació, 13, Pl. Gavà Park
08850 GAVÀ, Barcelona (Espanha)
Tel. +34 936 380 460 Fax +34 936 380 492
E: killgerm.iberia@killgerm.com

Conteúdo:
1 kg

Vazor® DOBOL 2 MG é um inseticida pertencente ao grupo dos Neonicotinoid.
A substância ativa acetamipride atua nos organismos por ingestão, expressando um efeito de choque e alguma atividade por contato.
Vazor® DOBOL 2 MG é especialmente eficaz no controlo de formigas argentinas (*Linepithema humile*) e formiga preta (*Lasius niger*).

Sua eficácia torna o produto ideal para ser utilizado em casas, apartamentos, ambientes internos ou cobertos.
Pode ser usada tanto no interior como no exterior.
Não existe risco de explosão ou incêndio.

UTILIZAÇÕES E DOSES

Aplicação localizada. Isco insecticida pronto a usar para ser aplicado no interior (cozinhas, despensas, armazéns, ...) ou no exterior (pátio, terraço, varanda, ...) em todas as áreas onde as formigas se proliferam e em le ninho.

Aplique uma fina camada de isco em uma placa (pronto a usar) ou misture o produto com água (pulverização ou molhado).

Aplique o produto em ¼ das superfícies a proteger (3m² para proteger 12m²).

Pó: polvilhe uma fina camada de Vazor® DOBOL 2 MG na dose de 20g / m²

Pulverização: Misture Vazor® DOBOL 2 MG em um pulverizador com água a uma taxa de 100g / l. Pulverizar 1 l de preparação em 5m²

Molhar: Use estritamente ao ar livre. Misture Vazor® DOBOL 2 MG em uma lata de água na taxa de 20 g por litro de água. Água 1 m² com 1l de preparação.

Não limpe as superfícies tratadas: limpe com detergente e água quente pare o efeito biocida.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS

Advertências de perigo: H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **Recomendações de prudência:** P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor.

**Em caso de acidente contactar o Centro de Informação Anti-Venenos,
Telef.: 800 250 250.**

NOTA

As recomendações e informações apresentadas são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. Todavia, os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar por ação de fatores que estão fora do nosso domínio (aplicação, fatores climáticos, etc.). A empresa garante a composição, formulação e conteúdo do produto. O utilizador será responsável pelos danos causados (falta de eficácia, resíduos, etc.) por inobservância total ou parcial das instruções contidas neste rótulo.

Edição 2 (profissional)

