

ynject contra el Picudo Rojo

+ Nuevo Protocolo
con Sivanto Prime

Agente

El Picudo Rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*) es un curculionido de gran tamaño (adulto de 2 a 5cm). Con **varias generaciones anuales**, sus diferentes estadios conviven durante todo el año. Tras emerger las puestas en la corona, las larvas excavan galerías hacia el interior, donde se alimentan, hasta pupar y metamorfosear a adulto, volviendo hembras y machos aparearse para cerrar el ciclo de 5 a 6 meses.

Atacan preferentemente a palmeras del género Phoenix, aunque también en ocasiones a las del género Washingtonia. Si no se controla a tiempo, provoca la **muerte de la palmera**.



CICLO BIOLÓGICO



Síntomas y daños

- a Hojas centrales con crecimiento acortado.
- b Hojas con comeduras en forma de V.
- c Hojas externas caídas.
- d Aspecto apolmado general de la corona de hojas.
- e Agujeros y galerías en cortes de poda.
- f Presencia de capullos en la base de la palmera.

Tratamiento

Cantidad de Ynject GO Palmera por palmera: 2 - 4
Cantidad de aplicación de tratamientos al año: 2 - 4

El tratamiento de endoterapia puede ser **combinado** con otras herramientas de **control integrado** frente al picudo rojo, como el monitoreo mediante trampas o la aplicación de nematodos entomopatógenos.

! **Los orificios son reutilizables.** Aprende cómo: <https://www.youtube.com/watch?v=xLimhHsTSS4>



Tipo de Ynject

Ynject GO Palmera

*Dosificar con:

SIVANTO PRIME (NºReg: ES-00503)
3 - 6 mL / Ynject GO Palmera
Máximo 12 mL por palmera



! Advertencia

Para evitar comunicación entre orificios aplicar a diferentes alturas



Accede a **vídeo tutoriales** sobre cómo se emplea Ynject, en [Youtube.com/Fertinyect](https://www.youtube.com/Fertinyect)



*Ynject GO Palmera **no contiene fitosanitarios**, pero debe ser dosificado. Consulta con tu distribuidor o en www.fertinyect.com los fitosanitarios y dosis autorizadas